

Collection
DONNÉES STATISTIQUES ET [illegible]

LES CHANGEMENTS DANS LA CONSOMMATION D'ALCOOL AU QUÉBEC

PRINCIPALES DONNÉES

[illegible]—ÉVALUATION SANTÉ [illegible]

DONNÉES STATISTIQUES ET INDICATEURS

LES CHANGEMENTS DANS LA CONSOMMATION D'ALCOOL AU QUÉBEC:

PRINCIPALES DONNÉES

BIBLIOTHÈQUE
SEP 10 1990
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PLANIFICATION ET DE L'ÉVALUATION

MINISTERE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

LES CHANGEMENTS DANS LA CONSOMMATION D'ALCOOL AU QUÉBEC:

PRINCIPALES DONNÉES

PAR

LAURENT ROY
DIRECTION DE L'ÉVALUATION

JUIN 1990

Ce document est disponible à la Direction générale
de la Planification et de l'Evaluation
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage, Québec
G1S 2M1
Téléphone: 418 - 643-1143

DEPOT LEGAL - 3e TRIMESTRE 1990
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU QUEBEC
ISBN: 2 - 550 - 20997 - 4

91-05580/

TITRE

ROY, L., Les changements dans la consommation d'alcool au Québec: Principales données, Direction générale de la Planification et de l'Évaluation, ministère de la Santé et des Services sociaux, juin 1990, 50 pages.

RÉSUMÉ

Ce document comprend trois parties.

La **première partie** trace un portrait récent de la consommation d'alcool au Québec à partir des données de l'enquête Santé Québec. On y trouve des statistiques pour les principaux groupes d'âge de la population masculine et féminine, sur le type de buveur, sur les quantités d'alcool consommées, sur la fréquence de consommation et sur l'abus de l'alcool.

La **seconde partie** fait ressortir les principaux changements dans la consommation d'alcool survenus principalement au cours de la dernière décennie. Les statistiques sur le volume des ventes montrent quelle a été l'évolution de la consommation d'alcool per capita. Les statistiques des enquêtes Santé Canada (1978-1979), Promotion de la santé (1985) et Santé Québec (1987) révèlent pour leur part quelles ont été les modifications dans les habitudes de boire des hommes et des femmes, des jeunes et des adultes, des buveurs excessifs, etc.

La **troisième partie** présente quelques données permettant de situer le niveau de consommation d'alcool des Québécois par rapport à celui des populations des autres provinces canadiennes, et plus particulièrement par rapport à celui des Ontariens.

L'ensemble des statistiques présentées et les indicateurs utilisés permettent d'apprécier le degré des changements survenus dans la consommation d'alcool au Québec au cours des dernières années.

REMERCIEMENTS

L'auteur remercie madame Claire Chamberland de la direction de l'Évaluation et monsieur René Cloutier de la direction de la Réadaptation pour leurs précieux commentaires. Merci également à monsieur Gilles-Yvon Picard de la direction de l'Évaluation pour le support technique et professionnel ainsi qu'à madame Diane Beaulé pour son excellent travail de secrétariat.

TABLE DES MATIERES

PAGE

RÉSUMÉ V

REMERCIEMENTS VII

TABLE DES MATIERES IX

LISTE DES TABLEAUX XI

LISTE DES GRAPHIQUES XV

INTRODUCTION 1

PARTIE 1 - PORTRAIT ACTUEL 3

PARTIE 2 - LES CHANGEMENTS DANS LA CONSOMMATION D'ALCOOL 19

2.1 - LES VENTES 19
2.2 - LES ENQUETES 19

PARTIE 3 - COMPARAISONS INTERPROVINCIALES 41

CONCLUSION 47

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 49

LISTE DES TABLEAUX

PAGE

Tableau 1
Type de buveurs, selon l'âge et le sexe, en pourcentage
Population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 5

Tableau 2
Quantité hebdomadaire d'alcool consommée selon le sexe
Population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 9

Tableau 3
Proportion de la population adulte concernée par l'abus de l'alcool, 1987 10

Tableau 4
Quantité hebdomadaire d'alcool consommée, groupe quinquennal d'âge et sexe, dans la population totale âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 11

Tableau 5
Quantité hebdomadaire d'alcool consommée, grands groupes d'âge et sexe, dans la population totale âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 12

Tableau 6
Risques reliés à la consommation d'alcool (indice Cage) selon l'âge et le sexe, dans la population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 13

Tableau 7
Personnes dépendantes de l'alcool (DSM-III), selon l'âge et le sexe, dans la population âgée de 15 ans et plus (%), Québec, 1987 15

Tableau 8
Fréquence de consommation d'alcool, grands groupes d'âge et sexe, dans la population totale âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 16

Tableau 9
Fréquence de consommation d'alcool, groupe quinquennal d'âge et sexe, dans la population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 17

Tableau 10
Consommation de spiritueux, de vin et de bière (en milliers de litres), au Québec, 1960 à 1987 24

Tableau 11
Consommation de litres de spiritueux, de vin et de bière per capita (population de 15 ans et plus), au Québec, 1960 à 1987 25

Tableau 12
Consommation en litre d'alcool pur, de spiritueux, de vin et de bière, per capita (population de 15 ans et plus), au Québec, 1960 à 1987 27

Tableau 13
Type de buveurs (en %), dans la population âgée de 15 ans et plus, en 1978-1979 et 1987, selon le sexe 30

Tableau 14
Type de buveurs (en %), dans la population âgée de 15 ans et plus, selon le sexe, Québec, d'après trois enquêtes 30

Tableau 15
Proportion de buveurs dans la population, selon le genre de buveurs, par groupe d'âge, Québec, 1978-1979 et 1987 31

Tableau 16
Proportion d'adultes âgés de 15 ans et plus qui boivent 14 consommations et plus par semaine, selon l'âge et le sexe, Québec, 1978-1979 et 1987 34

Tableau 17
Type de buveurs (en %), dans la population âgée de 15 ans et plus, sexes réunis, et quantité hebdomadaire consommée, Québec, 1978-1979 et 1987 37

Tableau 18
Comparaison des enquêtes Santé Québec et Promotion de la santé, concernant la proportion de gros buveurs, dans la population âgée de 15 ans et plus, selon le sexe, Québec, 1987 et 1985 38

Tableau 19
Répartition des buveurs selon les changements dans leurs habitudes de consommation, selon le sexe et l'âge, Québec, 1987 39

Tableau 20
Vente de boissons alcooliques (en litres) per capita, par province, 1987 42

Tableau 21
Consommation d'alcool per capita (litres d'alcool pur), par province, 1987 43

Tableau 22
Consommation per capita (population de 15 ans et plus), de spiritueux, de vin et de bière, en litres d'alcool pur, en Ontario, 1960 à 1987 44

LISTE DES GRAPHIQUES

PAGE

Graphique 1
Type de buveur dans la population, 1987 6

Graphique 2
Proportion d'adultes abstinents, 1987 7

Graphique 3
Proportion de buveurs habituels, 1987 8

Graphique 4
Personnes dépendantes à l'alcool, 1987 14

Graphique 5
Buveurs: au moins de 4 à 6 fois semaine, 1987 18

Graphique 6
Consommation d'alcool, 1960-1987, alcool pur 23

Graphique 7
Consommation de bière, vin, spiritueux 26

Graphique 8
Part relative: bière, vin, spiritueux 28

Graphique 9
Type de buveur dans la population - homme et femme 29

Graphique 10
Buveurs habituels, homme 32

Graphique 11
Buveurs habituels, femme 33

Graphique 12
14 consommations et plus par semaine, homme 35

Graphique 13
14 consommations et plus par semaine, femme 36

Graphique 14
Boivent moins qu'avant, 1987 40

Graphique 15
Consommation per capita, Québec, Ontario, 1976-1987 45

INTRODUCTION

La consommation d'alcool est une source constante de préoccupation surtout à cause de ses conséquences pour l'individu et la société. Il est très curieux de constater que c'est un domaine plutôt mal documenté. D'ailleurs jusqu'à récemment les données sur les caractéristiques des consommateurs d'alcool étaient fort peu nombreuses et les changements de cette habitude de vie dans le temps, méconnus. A partir du moment où la consommation totale d'alcool s'élevait dans la population, il devenait impérieux d'en connaître davantage sur les tendances respectives de consommation des divers groupes composant la population québécoise. Les femmes boivent-elles autant que les hommes ? Boivent-elles de plus en plus ? Et les jeunes, où en sont-ils dans leur habitude de boire ? Adoptent-ils le même modèle de consommation que les adultes ? Autant de questions qui méritent d'être approfondies.

Pour la première fois de son histoire, le Québec possède deux enquêtes représentatives de l'ensemble de sa population qui permettent non seulement de mieux connaître les caractéristiques des consommateurs d'alcool, mais qui permettent surtout de mesurer les changements dans la consommation des divers groupes au Québec depuis une décennie.

L'objectif de ce document est de rendre disponibles les principales données québécoises de l'enquête Santé Canada réalisée en 1978-79 et celles de l'enquête Santé Québec réalisée en 1987. Dans un premier temps, nous tracerons à grands traits un portrait récent de la consommation d'alcool tel que le dévoile Santé Québec (1987); pour répondre aux divers besoins des utilisateurs, nous présentons à la fois les données par grands groupes d'âge et celles par groupes quinquennaux d'âge. Par la suite, la comparaison de quelques principales statistiques tirées des deux enquêtes permettra de dévoiler les changements observés dans la consommation d'alcool au Québec depuis 1978-79. Enfin, nous compléterons le tableau avec quelques données sur la vente des boissons alcooliques.

PARTIE 1 - PORTRAIT ACTUEL

- La consommation d'alcool concerne la grande majorité des adultes (graphique 1). Quatre vingt dix pour cent des hommes, âgés de 15 ans et plus, déclarent avoir déjà consommé de l'alcool que ce soit de façon habituelle ou à titre d'ancien buveur [1].

  Quatre vingt pour cent des femmes déclarent de même avoir déjà fait l'expérience de l'alcool.

  Il ne reste qu'une minorité d'adultes qui déclarent n'avoir jamais consommé d'alcool (Tableau 1).

- L'alcool demeure cependant encore davantage l'affaire des hommes que des femmes. La proportion de femmes qui s'abstiennent de boire est plus du double de celle calculée chez les hommes. La proportion des femmes abstinentes s'élève à 20 % alors que la proportion n'est que de 9 % chez les hommes. A tous les âges (graphique 2), on compte plus d'abstinentes que d'abstinents.

- Tous les hommes ne boivent pas également. Ceux âgés entre 18 et 50 ans sont davantage représentés parmi les buveurs habituels. En deça et au-delà de ces âges, on est moins nombreux à boire sur une base régulière (graphique 3).

- La majorité de l'alcool est consommée par une minorité d'adultes. Près de 70 % des hommes et 87 % des femmes prennent moins d'une consommation par jour (tableau 2). Seulement 12,2 % des hommes et 2,4 % des femmes déclarent boire quatorze consommations et plus par semaine.

---

1 Selon les enquêtes Santé Canada et Santé Québec, sont considérés comme buveurs habituels, ceux qui consomment de l'alcool au moins une fois par mois; comme buveurs occasionnels ceux qui consomment de l'alcool moins d'une fois par mois; comme abstinents, ceux qui déclarent en avoir jamais consommé; comme ancien buveur ceux qui en ont déjà consommé, mais pas au cours de la dernière année.

Un sondage Gallup réalisé en 1983 révélait d'ailleurs que 80 % de toute la bière était alors consommée par les hommes et seulement 20 % par les femmes. Qui plus est, 16 % de la population adulte consommait 78 % de toute la bière vendue (sondage Omnibus Gallup, 1983).

- Environ 10 % des hommes adultes et 3 % des femmes consomment de façon excessive. C'est du moins ce qui se dégage de diverses mesures ou méthodes utilisées destinées à cerner la population à risque ou dépendante de l'alcool (tableaux 3 à 7).

Les quatre mesures montrent toutes un fort écart entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la consommation excessive (tableau 3). Chez les hommes, les plus grands consommateurs, à risque ou dépendants de l'alcool, se concentrent dans les groupes d'âge de 25 à 44 ans. Chez les femmes, ce serait plutôt chez les 15 à 24 ans (tableaux 4, 5, 6 et 7).

Comme il a été noté dans d'autres enquêtes, la consommation excessive mesurée par des questions directes sur le volume d'alcool consommé conduirait à une sous-déclaration des quantités bues par les individus. C'est ce qu'on observe au tableau 3. Le questionnaire CAGE qui permet d'estimer les buveurs à risque et le DSM-III qui mesure la dépendance de l'alcool se rapprochent sans doute davantage de la réalité, encore qu'on ne peut rien affirmer de façon sûre.

- Ce sont les personnes âgées de plus de 55 ans qui boivent le plus régulièrement, mais de faibles quantités à la fois. Par contre, les jeunes qui boivent les plus grandes quantités à la fois boivent peu souvent (tableaux 8 et 9; graphique 5). Les personnes âgées se serviraient-elles de l'alcool comme médicament alors que les jeunes consommeraient pour faire la fête ?

TABLEAU 1:
TYPE DE BUVEURS, SELON L'AGE ET LE SEXE, EN POURCENTAGE, POPULATION AGÉE DE 15 ANS ET PLUS, QUÉBEC, 1987

AGE	HOMME				FEMME			
	TYPE DE BUVEUR[1]							
	ABSTINENT	ANCIEN BUVEUR	BUVEUR OCCASIONNEL	BUVEUR HABITUEL	ABSTINENT	ANCIEN BUVEUR	BUVEUR OCCASIONNEL	BUVEUR HABITUEL
15-17	29,4	3,7	25,4	41,5	28,9	2,4	29,9	38,7
18-19	7,4	1,1	14,9	76,6	8,5	1,8	24,2	65,4
20-24	6,6	2,7	12,8	77,9	5,9	3,7	25,8	64,5
25-29	4,5	2,4	15,9	77,1	9,1	3,7	28,6	58,5
30-34	5,6	3,6	10,8	79,9	10,0	2,7	28,5	58,8
35-39	4,8	4,6	14,7	75,9	14,0	3,3	28,1	54,6
40-44	3,9	4,5	12,4	79,3	15,4	2,6	27,4	54,5
45-49	4,8	6,0	13,3	75,8	18,1	7,0	21,3	53,5
50-54	5,7	7,7	11,5	75,1	19,8	5,7	27,6	46,9
55-59	10,8	11,3	10,6	67,2	33,1	7,2	19,7	39,9
60-64	14,4	10,3	14,6	60,7	35,1	6,7	23,3	34,8
65-69	13,7	17,1	12,1	57,0	40,2	10,9	18,4	30,5
70-74	21,0	15,7	11,5	51,8	52,3	11,3	17,2	19,1
75-96	22,4	22,9	9,7	45,0	55,1	7,7	14,9	22,4
TOTAL	8,9	6,2	13,8	71,1	20,3	4,9	25,1	49,7

1. Selon Santé Québec, sont considérés comme buveurs habituels ceux qui en consomment au moins une fois par mois; comme buveurs occasionnels ceux qui consomment de l'alcool moins d'une fois par mois; comme abstinents, ceux qui déclarent en avoir jamais consommé; comme anciens buveurs, ceux qui en ont déjà consommé, mais pas au cours de la dernière année.

SOURCE: Enquête Santé Québec

GRAPHIQUE 1

TYPE DE BUVEUR DANS LA POPULATION

1987



SOURCE: Tableau 1

GRAPHIQUE 2

PROPORTION D'ADULTES ABSTINENTS

1987



SOURCE: Tableau 1

GRAPHIQUE 3

PROPORTION DE BUVEURS HABITUELS



SOURCE: Tableau 1

TABLEAU 2:
QUANTITÉ HEBDOMADAIRE D'ALCOOL CONSOMMÉE SELON LE SEXE,
POPULATION AGÉE DE 15 ANS ET +, QUÉBEC, 1987

NOMBRE DE CONSOMMATIONS PAR SEMAINE	HOMME %		FEMME %	
Aucune	30,8		47,5	
1-6	38,2	69,0	39,6	87,1
7-13	14,0		6,0	
14-28	9,1		2,1	
29 & +	3,1		0,3	
Inconnu	4,8		4,5	
TOTAL	100,0		100,0	

SOURCE: Enquête Santé Québec, 1987

TABLEAU 3:
PROPORTION DE LA POPULATION ADULTE CONCERNÉE PAR L'ABUS DE L'ALCOOL
1987

	HOMME	FEMME	TOTAL
- Buveurs excessifs (29 consommations & + par semaine)	3,1	0,3	1,6
- Buveurs à risques élevés (CAGE) *	14,8	5,2	10,3
- Buveurs dépendants à l'alcool (DSM-III) **	10,0	2,8	6,3
- Ont des problèmes avec l'alcool (déclaration par les tiers)	9,4	3,4	6,3

* Indice permettant d'identifier les individus à risque élevé de problèmes de santé liés à leur consommation d'alcool. Indice construit à partir d'un questionnaire concernant le comportement, les sentiments et les problèmes causés par l'alcool.

** La dépendance alcoolique est définie par un mode de consommation pathologique et par un handicap de fonctionnement professionnel ou social.

SOURCE: Enquête Santé Québec, 1987.

TABLEAU 4:
QUANTITÉ HEBDOMADAIRE D'ALCOOL CONSOMMÉE, GROUPE QUINQUENNAL D'AGE ET SEXE, DANS LA POPULATION TOTALE AGÉE DE 15 ANS & +, QUEBEC.1987

AGE	NOMBRE DE CONSOMMATIONS											
	AUCUNE		1-6		7-13		14 & +		INCONNU		TOTAL	
	HOMME	FEMME	HOMME	FEMME	HOMME	FEMME	HOMME	FEMME	HOMME	FEMME	HOMME	FEMME
15-19	49,27	53,61	30,67	33,28	9,64	4,45	5,23	3,99	5,18	4,67	100,00	
20-24	24,59	38,87	41,63	46,64	10,06	7,82	14,42	3,40	3,30	3,26	100,00	
25-29	26,41	43,46	42,92	45,30	13,92	7,95	13,18	1,84	3,58	1,45	100,00	
30-34	22,81	37,49	41,61	50,44	18,21	8,07	14,98	1,71	2,39	2,28	100,00	
35-39	24,09	41,05	42,86	46,60	15,54	6,95	15,59	2,61	1,93	2,79	100,00	
40-44	22,68	40,45	44,89	46,40	13,75	7,66	15,34	2,59	3,33	2,89	100,00	
45-49	26,81	44,23	39,91	43,81	15,39	6,66	12,98	1,82	4,92	3,49	100,00	
50-54	27,78	40,65	40,41	41,74	15,44	5,94	11,46	3,33	4,92	8,34	100,00	
55-59	33,03	56,13	31,31	32,48	14,52	3,03	11,12	1,05	10,02	7,31	100,00	
60-64	38,19	58,55	30,49	28,96	11,75	3,66	10,50	2,36	9,07	6,47	100,00	
65-69	45,91	61,07	28,87	24,94	10,04	1,43	8,63	2,85	6,55	9,72	100,00	
70-74	47,49	73,34	26,39	15,76	9,16	2,42	9,42	1,26	7,54	7,22	100,00	
75-79	55,26	71,84	22,60	13,48	8,36	4,15	1,87	0,70	11,91	9,83	100,00	
80-84	42,98	74,32	29,55	16,22	12,24	1,65	-	0,00	14,87	7,81	100,00	
85-89	43,28	68,34	32,12	20,00	-	-	-	8,42	14,49	3,24	100,00	
TOTAL	30,84	47,54	38,17	39,62	14,04	5,95	12,16	2,41	4,80	4,48	100,00	

SOURCE: Enquête Santé-Québec, 1987

TABLEAU 5:
QUANTITÉ HEBDOMADAIRE D'ALCOOL CONSOMMÉE, GRANDS GROUPES D'AGE ET SEXE, DANS LA POPULATION TOTALE AGÉE DE 15 ANS & +, QUÉBEC, 1987

AGE/SEXE		NOMBRE DE CONSOMMATIONS PAR SEMAINE						
		AUCUNE	1-6	7-13	14-28	29 & +	INCONNU	TOTAL
15-24	H	36,5	36,3	13,0	7,9	2,1	4,2	100,0
	F	45,9	40,3	6,2	3,4	0,3	3,9	
25-44	H	24,0	43,0	15,4	11,2	3,5	2,9	100,0
	F	40,7	47,2	7,7	1,8	0,3	2,3	
45-64	H	31,2	35,8	14,4	8,1	3,5	7,0	100,0
	F	49,5	37,3	4,9	1,9	0,2	6,2	
65 & +	H	47,8	27,0	9,5	4,6	2,2	8,9	100,0
	F	67,9	19,3	2,1	1,8	0,1	8,8	
TOTAL	H	30,8	38,2	14,0	9,1	3,1	4,8	100,0
	F	47,5	39,6	6,0	2,1	0,3	4,5	

SOURCE: Enquête Santé Québec, 1987

TABLEAU 6:
RISQUES RELIÉS A LA CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICE CAGE) SELON L'AGE ET LE SEXE, DANS LA POPULATION AGÉE DE 15 ANS & +, QUÉBEC, 1987

AGE / SEXE		RISQUES NULS	RISQUES FAIBLES	RISQUES ÉLEVÉS	INCONNU	TOTAL
15-24	H	71,0	14,0	12,2	2,8	100,0
	F	80,9	9,6	6,8	2,7	
25-44	H	66,1	14,0	17,6	2,3	100,0
	F	83,0	7,9	6,4	2,7	
45-64	H	65,5	14,2	15,1	5,2	100,0
	F	81,9	5,6	4,1	8,4	
65 & +	H	72,9	9,6	7,5	10,0	100,0
	F	82,6	2,4	1,5	13,5	
TOTAL	H	67,7	13,6	14,8	3,9	100,0
	F	82,3	6,9	5,2	5,6	

SOURCE: Enquête Santé Québec, 1987

GRAPHIQUE 4

PERSONNES DEPENDANTES DE L'ALCOOL

1987



SOURCE: Tableau 7

TABLEAU 7:
PERSONNES DÉPENDANTES DE L'ALCOOL (DSM-III), SELON L'AGE ET LE SEXE, DANS LA POPULATION AGÉE DE 15 ANS & + (%), QUÉBEC, 1987

AGE /	SEXE	DÉPENDANCE A L'ALCOOL	PAS DE DÉPENDANCE	INCONNU	TOTAL
15-24	H	8,7	90,0	1,3	100,0
	F	5,3	92,5	2,2	
25-44	H	11,9	87,0	1,1	100,0
	F	3,3	95,5	1,2	
45-64	H	9,9	87,4	2,7	100,0
	F	1,5	93,8	4,7	
65 & +	H	4,1	90,6	5,3	100,0
	F	0,3	89,6	10,1	
TOTAL	H	10,0	88,1	1,9	100,0
	F	2,8	93,7	3,5	

SOURCE: Enquête Santé Québec, 1987

TABLEAU 8:
FRÉQUENCE DE CONSOMMATION D'ALCOOL, GRANDS GROUPES D'AGE ET SEXE, DANS LA POPULATION TOTALE AGÉE DE 15 ANS & +, QUÉBEC, 1987

AGE/SEXE		CHAQUE JOUR	4-6 FOIS/SEMAINE	2-3 FOIS/SEMAINE	UNE FOIS SEMAINE	MOINS D'UNE FOIS SEMAINE	NON BUVEUR
15-24	H	0,7	3,7	18,0	22,4	38,8	16,4
	F	0,1	0,7	10,2	20,2	52,7	16,1
25-44	H	5,3	9,7	21,4	21,9	33,2	8,5
	F	1,3	3,5	10,3	18,3	51,5	15,1
45-64	H	12,5	8,5	19,4	15,2	27,1	17,3
	F	2,4	3,6	7,1	15,4	38,9	32,6
65 & +	H	11,0	6,5	12,1	11,3	22,3	36,8
	F	3,3	1,7	4,2	6,1	26,6	58,1
TOTAL	H	6,7	7,8	19,3	19,3	31,7	15,2
	F	1,6	2,7	8,7	16,4	45,4	25,2

SOURCE: Enquête Santé Québec, 1987

TABLEAU 9:
FREQUENCE DE CONSOMMATION D'ALCOOL, GROUPE QUINQUENNAL D'AGE ET SEXE, DANS LA POPULATION AGÉE DE 15 ANS & +, QUEBEC, 1987

AGE	CHAQUE JOUR		4-6 FOIS/ SEMAINE		2-3 FOIS/ SEMAINE		UNE FOIS/ SEMAINE		MOINS D'UNE FOIS/ SEMAINE		NON BUVEUR	
	HOMME	FEMME	HOMME	FEMME	HOMME	FEMME	HOMME	FEMME	HOMME	FEMME	HOMME	FEMME
15-17	0,16	0,00	0,47	0,10	4,43	4,53	12,18	11,92	49,64	52,11	33,12	31,33
18-19	0,64	0,27	2,03	1,53	21,25	12,88	31,08	25,54	36,48	49,46	8,52	10,32
20-24	1,08	0,14	6,11	0,67	24,95	12,30	25,37	23,02	33,24	54,22	9,25	9,64
25-29	1,91	0,28	6,56	1,77	25,72	9,72	22,05	21,40	36,83	54,03	6,93	12,80
30-34	4,96	1,31	11,47	3,56	19,73	11,03	23,42	18,75	31,17	52,69	9,25	12,66
35-39	5,64	1,64	11,22	4,27	21,11	9,97	22,04	17,00	30,61	49,80	9,37	17,32
40-44	9,27	2,44	9,61	4,50	18,78	10,46	19,28	15,27	34,10	49,24	8,37	18,10
45-49	11,30	1,83	9,73	5,56	23,63	6,86	15,22	18,79	29,29	41,78	10,83	25,17
50-54	12,60	3,34	9,31	3,68	21,11	8,33	18,30	16,84	25,29	42,29	13,39	25,53
55-59	13,66	1,87	7,79	1,80	17,07	8,14	13,39	13,03	25,97	34,78	22,13	40,38
60-64	13,12	2,66	6,99	2,84	14,29	5,02	13,73	11,66	27,12	36,03	24,75	41,80
65-69	10,39	3,09	6,31	2,97	15,14	4,77	12,26	8,23	25,09	29,84	30,83	51,11
70-74	13,53	3,11	8,21	0,99	9,21	3,00	10,66	5,22	21,70	24,06	36,68	63,63
75-96	9,29	3,77	5,20	0,71	10,65	4,43	10,51	3,93	19,07	24,43	45,29	62,74
TOTAL	6,7	1,6	7,8	2,7	19,3	8,7	19,3	16,4	31,7	45,4	15,2	25,2

SOURCE: Enquête Santé Québec, 1987

GRAPHIQUE 5

BUVEURS:AU MOINS DE 4 A 6 FOIS SEMAINE

1987



SOURCE: Tableau 9

PARTIE 2 - LES CHANGEMENTS DANS LA CONSOMMATION D'ALCOOL

Deux principales sources de données permettent de mesurer les changements dans la consommation d'alcool: les statistiques sur les ventes et celles provenant d'enquêtes. Nous utilisons principalement l'enquête Santé Québec (1987), l'enquête Santé Canada (1978-79) et à l'occasion, l'enquête sur la Promotion de la santé (1985) pour valider les changements observés entre les deux premières enquêtes.

2.1 LES VENTES

- Il s'est consommé 632 millions de litres d'alcool au Québec pour la seule année 1987 (tableau 10). Un sommet en termes de nombre de litres vendus per capita a été atteint en 1976 (tableau 11). Une baisse s'est alors amorcée qui s'est poursuivie jusqu'en 1987, dernière année disponible. Les ventes per capita de boissons alcooliques ont chuté au cours de cette période de 16,3 %. Les ventes de bière ont baissé de 19,8 %; celles des spiritueux de 42,2 % alors que celles de vin augmentaient de 55 %.

  Si l'on s'intéresse à l'aspect santé, c'est le nombre de litres d'alcool pur qui doit retenir l'attention. A cet égard, on doit noter la place de plus en plus grande occupée par le vin dans les habitudes de boire (tableau 12 et graphique 8). Ce type de boisson représente près du quart de tout l'alcool pur bu par les Québécois. La bière qui représentait 71,5 % de la consommation n'en représente plus que 57,9 % en 1987.

2.2 LES ENQUETES

La baisse de consommation observée dans les chiffres sur les ventes se reflète-t-elle dans les enquêtes ?

- En comparant Santé Canada (1978-79) et Santé Québec (1987), on observe d'abord que la proportion de buveurs habituels décline et ce, autant chez les femmes que chez les hommes (tableau 13 et graphique 9). Cette baisse de buveurs habituels dans la population se fait au profit des non buveurs. Davantage d'adultes ont déclaré ne pas boire en 1987 qu'en 1978-79.

- Il est surprenant de constater que la proportion de buveurs habituels s'est abaissée aussi chez les femmes. On aurait pu croire qu'elles étaient en train d'effectuer un certain rattrapage par rapport aux hommes. Or, elles aussi, même déjà moins nombreuses à boire, ont effectué un certain retrait. Ces résultats sont confirmés par l'enquête sur la Promotion de la santé réalisée en 1985 (tableau 14).

- La réduction de la proportion des buveurs habituels s'étend à l'ensemble des groupes d'âge. Il s'agit donc d'une baisse généralisée (tableau 15 et graphiques 10 et 11).

- La proportion d'adultes buvant quatorze consommations et plus par semaine a également décliné (tableau 16). Cette proportion s'est réduite du tiers de 1978-79 à 1987. La diminution est généralisée à tous les groupes d'âge quoiqu'elle semble un peu plus prononcée chez les jeunes de moins de trente ans (graphiques 12 et 13). Une seule exception: le groupe des jeunes filles âgées de moins de 20 ans. On y trouverait plus de buveuses de quatorze consommations et plus par semaine en 1987 qu'en 1978-79. Mais les nombres de consommatrices en cause sont peu élevés et appellent à la prudence quant à l'interprétation des changements.

En somme, parmi les buveurs habituels, ceux qui ont contribué à la baisse de la consommation, ce ne sont pas tant les buveurs de fai-

bles quantités hebdomadaires mais les grands buveurs (tableau 17).

L'enquête sur la Promotion de la santé (1985) confirme les tendances mises en évidence par l'enquête Santé Québec concernant la proportion de buveurs de quatorze consommations et plus par semaine. Le tableau 18 rapproche les résultats des deux enquêtes.

- Une bonne proportion d'individus perçoivent avoir diminué leur consommation d'alcool. Vingt pour cent des hommes et 13 % des femmes déclarent en 1987 boire moins qu'avant alors que seulement 5 % des hommes et 4 % des femmes mentionnent le contraire (tableau 19).

Parmi les adultes âgés de moins de 50 ans, ce sont les jeunes de 18 à 30 ans qui sont les plus nombreux à déclarer une réduction de leur consommation (graphique 14).

Ces statistiques sur les changements déclarés par les individus confirment donc les observations qu'on tire de la comparaison des données sur le niveau de consommation des enquêtes Santé Canada et Santé Québec. Elles vont donc dans le même sens également des tendances observées dans les ventes de boissons alcooliques.

- En bref, la baisse de consommation est relativement importante. Elle a touché autant les femmes que les hommes. Elle a touché tous les groupes d'âge.

Ce sont cependant surtout les gros buveurs qui auraient contribué à réduire la consommation totale d'alcool au Québec, en particulier ceux âgés de moins de 30 ans, ce qui confirme la théorie (L.DeLint et al., 1977) voulant qu'autant varie la consommation

per capita d'alcool, autant varie dans la population la proportion de buveurs excessifs.

Un seul groupe semble n'avoir pas suivi le mouvement à la baisse, il s'agit des jeunes filles âgées de moins de 20 ans. Etant donné les faibles nombres de l'échantillon, il est difficile de se prononcer de façon catégorique sur les tendances de leur consommation; reste que plusieurs indices laissent croire qu'elles n'ont pas, bien au contraire, suivi le mouvement à la baisse.

GRAPHIQUE 6

CONSOMMATION D'ALCOOL, 1960 – 1987

ALCOOL PUR



SOURCE: Tableau 12

TABLEAU 10:
CONSOMMATION DE SPIRITUEUX, DE VIN ET DE BIERE (EN MILLIERS DE LITRES), AU QUÉBEC, 1960 A 1987

ANNÉE	SPIRITUEUX	VIN	BIERE	TOTAL
1960	14 524	9 715	318 197	342 436
1961	14 638	10 233	321 952	346 823
1962	15 410	10 764	329 894	356 068
1963	15 815	11 074	354 010	380 899
1964	16 797	12 196	366 566	395 559
1965	13 915	10 242	387 851	412 008
1966	18 906	14 838	388 883	422 627
1967	20 693	16 270	403 912	440 875
1968	22 239	17 133	429 960	469 332
1969	13 497	11 815	450 735	476 047
1970	21 066	19 606	448 540	489 212
1971	21 638	21 543	471 724	514 905
1972	24 962	26 548	499 332	550 842
1973	26 180	28 662	543 010	597 852
1974	28 298	35 763	562 890	626 951
1975	31 672	40 196	574 014	645 882
1976	33 290	41 500	598 926	673 716
1977	33 322	44 501	601 636	679 459
1978	34 081	48 365	594 403	676 849
1979	34 014	57 507	588 461	679 982
1980	27 990	57 752	590 234	675 976
1981	31 653	60 746	590 959	683 358
1982	30 398	62 601	583 278	676 277
1983	27 906	61 855	555 460	645 221
1984	26 829	64 647	565 772	657 248
1985	25 589	68 552	559 077	653 218
1986	23 895	74 275	548 826	646 996
1987	21 711	72 565	538 082	632 358

SOURCE: Statistique Canada, CAT. 63-202

TABLEAU 11:
CONSOMMATION DE LITRES DE SPIRITUEUX, DE VIN ET DE BIERE PER CAPITA (POPULATION DE 15 ANS & +), AU QUÉBEC, 1960 A 1987

ANNÉE	SPIRITUEUX	VIN	BIERE	TOTAL
1960	4,41	2,95	96,28	103,64
1961	4,32	3,00	94,82	102,14
1962	4,41	3,09	94,82	102,32
1963	4,45	3,09	99,42	106,96
1964	4,59	3,36	100,60	108,55
1965	3,73	2,73	103,87	110,33
1966	4,91	3,86	101,33	110,10
1967	5,23	4,14	102,47	111,84
1968	5,50	4,27	106,65	116,42
1969	3,27	2,86	109,42	115,55
1970	5,00	4,68	106,92	116,60
1971	5,09	5,09	111,19	121,37
1972	5,77	6,14	115,51	127,42
1973	5,95	6,50	123,15	135,60
1974	6,27	7,91	124,74	138,92
1975	6,90	8,80	125,00	140,70
1976	7,10	8,90	127,90	143,90
1977	7,00	9,30	126,30	142,60
1978	7,10	10,00	123,50	140,60
1979	7,00	11,80	121,10	139,90
1980	5,70	11,80	120,10	137,60
1981	6,30	12,00	117,20	135,50
1982	6,00	12,30	114,40	132,70
1983	5,50	12,10	108,90	126,50
1984	5,20	12,60	110,40	128,20
1985	5,00	13,30	108,30	126,60
1986	4,60	14,30	105,60	124,50
1987	4,10	13,80	102,50	120,40

SOURCE: Statistique Canada, CAT. 63-202

GRAPHIQUE 7

CONSOMMATION DE BIERE, VIN, SPIRITUEUX



SOURCE: Tableau 12

TABLEAU 12:
CONSOMMATION EN LITRE D'ALCOOL PUR, DE SPIRITUEUX, DE VIN ET DE BIERE, PER CAPITA (POPULATION DE 15 ANS & +), AU QUÉBEC, 1960 A 1987

ANNÉE	SPIRITUEUX	VIN	BIERE	TOTAL
1960	1,77	0,45	4,82	7,05
1961	1,73	0,50	4,73	6,96
1962	1,77	0,45	4,73	6,96
1963	1,77	0,45	4,96	7,18
1964	1,86	0,50	5,05	7,41
1965	1,50	0,41	5,18	7,09
1966	1,95	0,64	5,05	7,64
1967	2,09	0,64	5,14	7,86
1968	2,23	0,64	5,32	8,18
1969	1,32	0,41	5,46	7,18
1970	2,00	0,68	5,36	8,05
1971	2,05	0,77	5,55	8,36
1972	2,32	0,91	5,77	9,00
1973	2,36	0,95	6,18	9,50
1974	2,50	1,18	6,27	9,96
1975	2,77	1,32	6,23	10,32
1976	2,82	1,32	6,41	10,55
1977	2,77	1,41	6,32	10,50
1978	2,84	1,50	6,18	10,52
1979	2,80	1,77	6,06	10,63
1980	2,28	1,77	6,01	10,05
1981	2,52	1,80	5,86	10,18
1982	2,40	1,84	5,72	9,96
1983	2,20	1,80	5,40	9,41
1984	2,08	1,89	5,52	9,49
1985	2,00	1,99	5,41	9,40
1986	1,84	2,14	5,28	9,26
1987	1,64	2,07	5,12	8,83

SOURCE: Statistique Canada, CAT. 63-202, calculs de l'auteur

GRAPHIQUE 8

PART RELATIVE: BIERE, VIN, SPIRITUEUX



SOURCE: Calculs à partir du tableau 12

GRAPHIQUE 9

TYPE DE BUVEUR DANS LA POPULATION

HOMME ET FEMME



SOURCE: Tableau 13

TABLEAU 13:
TYPE DE BUVEURS (EN %), DANS LA POPULATION AGÉE DE 15 ANS & +, EN 1978-1979 ET 1987, SELON LE SEXE

SEXE	ANNÉE	TYPE DE BUVEURS			
		HABITUEL	OCCASIONNEL	NON BUVEUR	TOTAL
HOMME	1978-1979	78,0	13,0	9,0	100,0
	1987	71,0	14,0	15,0	
FEMME	1978-1979	55,0	26,0	19,0	100,0
	1987	50,0	25,0	25,0	

SOURCES: Enquête Santé Canada, 1978-1979 et Enquête Santé Québec, 1987

TABLEAU 14:
TYPE DE BUVEURS (EN %), DANS LA POPULATION AGÉE DE 15 ANS & +, SELON LE SEXE, QUÉBEC, D'APRES TROIS ENQUETES

ENQUETE	ANNÉE	N'A JAMAIS BU	ANCIEN BUVEUR	OCCASIONNEL	HABITUEL	TOTAL
			HOMME			
SANTÉ CANADA	1978-1979	5,5	3,9	12,3	78,3	100,0
PROMOTION SANTÉ	1985	6,6	11,5	13,8	68,1	100,0
SANTÉ QUÉBEC	1987	8,9	6,2	13,7	71,1	100,0
			FEMME			
SANTÉ CANADA	1978-1979	16,5	2,8	26,1	54,6	100,0
PROMOTION SANTÉ	1985	16,2	10,6	25,6	47,5	100,0
SANTÉ QUÉBEC	1987	20,3	4,9	25,1	49,7	100,0

SOURCES: Enquête Santé Canada, 1978-1979, Enquête Santé Québec, 1987 et Enquête Promotion de la santé, 1985

TABLEAU 15:
PROPORTION DE BUVEURS DANS LA POPULATION, SELON LE GENRE DE BUVEURS, PAR GROUPE D'AGE, QUÉBEC 1978-1979 ET 1987

GROUPE D'AGE	TYPE DE BUVEURS															
	HABITUEL				OCCASIONNEL				ANCIEN BUVEUR				JAMAIS BU			
	1978-79		1987		1978-79		1987		1978-79		1987		1978-79		1987	
	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
15-19	69,2	50,8	54,3	48,9	15,9	26,6	21,5	27,8	1,2	4,2	2,7	2,1	13,7	18,3	21,3	21,1
20-24	84,2	69,5	77,9	64,5	9,8	22,0	12,8	25,9	2,9	2,3	2,7	3,7	3,1	6,2	6,5	5,9
25-29	81,2	65,2	77,1	58,5	14,0	26,0	15,9	28,6	1,8	2,5	2,4	3,7	3,0	6,4	4,5	9,1
30-34	84,1	61,1	79,9	58,8	10,9	28,5	10,8	28,5	0,7	0,8	3,6	2,7	4,4	9,6	5,6	10,0
35-39	81,8	63,7	75,8	54,6	11,8	26,3	14,7	28,1	2,9	2,1	4,6	3,3	3,5	7,9	4,8	14,0
40-44	85,6	53,7	79,3	54,5	8,4	32,8	12,4	27,4	3,9	3,0	4,5	2,6	2,0	10,5	3,8	15,4
45-49	82,3	57,2	75,8	53,5	11,9	24,7	13,3	21,3	3,0	5,7	6,0	7,0	2,7	12,3	4,8	18,1
50-54	76,8	49,8	75,1	46,9	11,2	24,3	11,5	27,6	7,8	1,7	7,7	5,7	4,1	24,3	5,6	19,8
55-59	72,8	42,8	67,2	39,9	12,7	29,8	10,7	19,7	7,6	0,8	11,3	7,2	6,9	26,6	10,7	33,1
60-64	77,9	39,1	60,6	34,8	11,1	20,1	14,6	23,3	6,8	2,6	10,3	6,7	4,2	38,2	14,4	35,1
65-69	66,1	32,0	57,0	30,5	17,0	20,4	12,1	18,4	7,2	1,6	17,1	10,9	9,6	45,9	13,7	40,2
70 & +	61,9	32,4	48,3	20,8	14,8	29,2	10,6	16,0	14,9	6,8	19,4	9,3	8,4	31,6	21,7	53,8
TOTAL	78,3	54,6	71,1	49,7	12,3	26,1	13,8	25,1	3,9	2,8	6,2	4,9	5,5	16,5	8,9	20,3

SOURCES: Enquête Santé Canada, 1978-1979 et Enquête Santé Québec, 1987

GRAPHIQUE 10
BUVEURS HABITUELS

HOMME



SOURCE: Tableau 15

GRAPHIQUE 11

BUVEURS HABITUELS

FEMMES



SOURCE: Tableau 15

TABLEAU 16:
PROPORTION D'ADULTES AGÉS DE 15 ANS & + QUI BOIVENT 14 CONSOMMATIONS ET + PAR SEMAINE, SELON L'AGE ET LE SEXE, QUÉBEC, 1978-1979 ET 1987

GROUPE D'AGE	HOMME		FEMME	
	1978-1979	1987	1978-1979	1987
15-19	11,0	5,2	2,8	4,0
20-24	30,3	14,4	7,0	3,4
25-29	26,3	13,2	5,8	1,8
30-34	20,8	14,9	2,4	1,7
35-39	19,4	15,6	6,6	2,6
40-44	18,2	15,3	1,4	2,6
45-49	19,9	13,0	3,2	1,8
50-54	14,5	11,5	4,0	3,3
55-59	18,0	11,1	1,0	1,0
60-64	17,3	10,5	1,6	2,4
65-69	14,2	8,6	3,5	2,9
70 & +	15,2	5,5	0,0	1,3
TOTAL	20,0	12,2	3,7	2,4

SOURCES: Enquête Santé Canada, 1978-1979 et Enquête Santé Québec, 1987

GRAPHIQUE 12

14 CONSOMMATIONS ET PLUS PAR SEMAINE

HOMME



SOURCE: Tableau 16

GRAPHIQUE 13

14 CONSOMMATIONS ET PLUS PAR SEMAINE

FEMME



SOURCE: Tableau 16

TABLEAU 17:
TYPE DE BUVEURS (EN %), DANS LA POPULATION AGÉE DE 15 ANS & +, SEXES RÉUNIS ET QUANTITÉ HEBDOMADAIRE CONSOMMÉE, QUÉBEC, 1978-1979 ET 1987

ANNÉE	TYPE DE BUVEURS							
	JAMAIS BU	ANCIEN BUVEUR	OCCASIONNEL	HABITUEL NOMBRE DE CONSOMMATIONS				
				0-6	7-13	14 & +	INCONNU	TOTAL
1978-1979	10,6	3,2	18,5	37,0	10,8	10,1	5,6	63,4
1987	14,8	5,5	19,6	38,5	9,9	7,1	4,6	60,1

SOURCES: Enquête Santé Canada, 1978-1979 et Enquête Santé Québec, 1987

TABLEAU 18:
COMPARAISON DES ENQUETES SANTÉ-QUÉBEC ET PROMOTION DE LA SANTÉ, CONCERNANT LA PROPORTION DE GROS BUVEURS, DANS LA POPULATION AGÉE DE 15 ANS & +, SELON LE SEXE, QUÉBEC, 1987 ET 1985

ENQUETE SANTÉ QUÉBEC

SEXE	NON BUVEUR	BUVEUR OCCASIONNEL ET HABITUEL NOMBRE DE CONSOMMATIONS HEBDOMADAIRES			
		0-13	14 & +	INCONNU	TOTAL
HOMMES	15,1	67,7	12,1	4,8	84,9
FEMMES	25,2	67,9	2,3	4,5	74,8

ENQUETE PROMOTION DE LA SANTÉ

SEXE	NON BUVEUR	BUVEUR OCCASIONNEL ET HABITUEL NOMBRE DE CONSOMMATIONS HEBDOMADAIRES		
		0-15	16 & +	TOTAL
HOMMES	18,2	72,4	9,4	81,8
FEMMES	26,9	70,0	2,3	73,1

SOURCES: Enquête Santé Québec, 1987 et Promotion de la santé, 1985

TABLEAU 19:
RÉPARTITION DES BUVEURS SELON LES CHANGEMENTS DANS LEURS HABITUDES DE CONSOMMATION, SELON LE SEXE ET L'AGE, QUÉBEC, 1987

AGE	BOIS PLUS QU'AVANT		BOIS MOINS QU'AVANT		PAS DE CHANGEMENT	
	HOMME	FEMME	HOMME	FEMME	HOMME	FEMME
15-17	13,6	13,4	15,9	14,4	70,5	72,2
18-19	12,3	10,3	20,4	16,6	67,3	73,1
20-24	10,3	5,1	20,5	20,1	69,2	74,8
25-29	4,6	4,8	22,4	14,5	73,0	80,7
30-34	4,0	3,0	18,2	11,5	77,8	85,5
35-39	4,9	3,7	15,8	11,9	79,3	84,4
40-44	2,7	3,1	16,8	7,1	80,5	89,8
45-49	3,7	2,7	18,4	10,7	77,9	86,6
50-54	2,8	0,7	26,9	11,8	70,3	87,5
55-59	1,0	0,9	27,4	16,8	71,6	82,3
60-64	3,3	0,6	25,2	9,5	71,5	89,9
65 & +	0,6	1,4	22,5	12,0	76,9	86,6
TOTAL	5,1	4,0	20,2	13,1	74,7	82,9

SOURCE: Enquête Santé Québec, 1987

GRAPHIQUE 14

BOIVENT MOINS QU'AVANT

1987



SOURCE: Tableau 19

PARTIE 3 - COMPARAISONS INTERPROVINCIALES

- Au niveau national, le Québec vient au troisième rang pour sa consommation de bière derrière Terre-Neuve et l'Ontario. Le Québec vient au deuxième rang pour sa consommation de vin, devancé par la Colombie-Britannique. Il vient cependant au dernier rang pour sa consommation de spiritueux (tableau 20).

- En termes d'alcool pur consommé au total (sous quelque forme que ce soit) le Québec se classe au huitième rang au Canada (tableau 21)

- La baisse de consommation d'alcool n'est pas unique au Québec. Cependant le Québec accuse un déclin supérieur à celui qu'ont connu les habitants de la province voisine l'Ontario (tableau 22 et graphique 15). De 1981 à 1987, par exemple, la baisse de consommation totale d'alcool pur se situe à 12,7 % au Québec mais à 7,8 % en Ontario. Les spiritueux sont aussi en Ontario le type de boisson qui a davantage perdu la faveur des adultes.

- Un déclin dans la consommation d'alcool per capita a aussi été observé aux États-Unis depuis 1982. Là aussi, les spiritueux sont de plus en plus délaissés alors que le vin augmente en popularité (G. Williams, et al., 1986).

TABLEAU 20:
VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES (EN LITRES) PER CAPITA, PAR PROVINCE, 1987

PROVINCE	SPIRITUEUX	VIN	BIERE
TERRE-NEUVE	8.7	4.0	120.9
ILE-DU-PRINCE-EDOUARD	8.0	6.1	88.7
NOUVELLE-ÉCOSSE	8.9	8.1	89.8
NOUVEAU-BRUNSWICK	6.1	5.9	88.1
QUÉBEC	4.1	13.8	102.5
ONTARIO	8.7	11.6	109.2
MANITOBA	9.0	8.9	97.2
SASKATCHEWAN	9.8	6.7	82.4
ALBERTA	11.8	12.4	96.3
C. BRITANNIQUE	10.2	20.6	100.2
CANADA	8.0	12.5	102.7

SOURCE: Statistique Canada, CAT. 63-202

TABLEAU 21:
CONSOMMATION D'ALCOOL PER CAPITA (LITRES D'ALCOOL PUR), PAR PROVINCE, 1987

PROVINCE	LITRES	RANG
TERRE-NEUVE	10,1	4
ILE-DU-PRINCE-EDOUARD	8,5	9
NOUVELLE-ÉCOSSE	9,3	6
NOUVEAU-BRUNSWICK	7,7	10
QUÉBEC	8,9	8
ONTARIO	10,7	3
MANITOBA	9,8	5
SASKATCHEWAN	9,0	7
ALBERTA	11,4	2
C. BRITANNIQUE	12,2	1

SOURCE: Statistique Canada, CAT. 63-202

TABLEAU 22:
CONSOMMATION PER CAPITA (POPULATION DE 15 ANS & +), DE SPIRITUEUX, DE VIN ET DE BIERE, EN LITRES D'ALCOOL PUR, EN ONTARIO, 1960 A 1987

ANNÉE	SPIRITUEUX	VIN	BIERE	TOTAL
1960	2,50	0,54	5,14	8,14
1961	2,59	0,54	4,95	8,14
1962	2,68	0,59	5,00	8,23
1963	2,86	0,59	5,05	8,45
1964	3,04	0,59	5,09	8,73
1965	3,04	0,59	5,14	8,77
1966	3,32	0,64	5,14	9,09
1967	3,14	0,59	5,18	8,91
1968	3,36	0,68	5,09	9,14
1969	3,77	0,81	4,82	9,41
1970	3,32	0,77	5,18	9,27
1971	3,45	0,91	5,41	9,77
1972	3,82	1,04	5,68	10,55
1973	3,95	1,09	5,73	10,77
1974	4,23	1,09	5,91	11,23
1975	4,52	1,06	5,86	11,44
1976	4,48	1,13	5,81	11,42
1977	4,64	1,23	5,51	11,38
1978	4,60	1,36	5,59	11,55
1979	4,44	1,52	5,61	11,57
1980	4,44	1,56	5,57	11,57
1981	4,36	1,59	5,64	11,59
1982	4,28	1,66	5,55	11,49
1983	4,04	1,74	5,52	11,30
1984	3,76	1,74	5,53	11,03
1985	3,64	1,78	5,37	10,79
1986	3,48	1,77	5,55	10,80
1987	3,48	1,74	5,46	10,68

SOURCE: Statistique Canada, CAT. 63-202, calculs de l'auteur

GRAPHIQUE 15

CONSOMMATION PER CAPITA, QUÉBEC, ONTARIO

1976 – 1987



SOURCES: Tableaux 12 et 22

CONCLUSION

Les diverses sources statistiques concordent: on assiste depuis 1980 environ à une baisse importante de la consommation d'alcool au Québec. Tous les groupes de la population ont contribué au changement observé, y inclus les femmes, clientèle cible des compagnies depuis quelques années. Il apparait cependant que ce sont les buveurs de quatorze consommations et plus par semaine qui ont le plus contribué au déclin des ventes de boissons alcooliques.

Les changements observés semblent plus importants au Québec qu'ailleurs, en tout cas plus important qu'en Ontario et qu'aux Etats-Unis. Mais quelques points communs se dégagent: la consommation des spiritueux accuse une régression importante et les femmes demeurent loin derrière les hommes pour leur consommation d'alcool.

Plusieurs explications peuvent être trouvées à ces nouvelles tendances en matière d'alcool. Il semble d'abord qu'on rencontre de moins en moins de gens qui font un abus excessif d'une seule substance à la fois. Des alcooliques comme on en trouvait autrefois, on en rencontre, semble-t-il, de moins en moins. On substitue à l'alcool les psychotropes, ou bien on consomme à la fois alcool, médicaments et drogues.

D'autre part, de nouveaux modèles de consommation sont en train de s'imposer étant donné la plus grande sévérité à l'endroit des conducteurs conduisant avec facultés affaiblies, étant donné une plus grande préoccupation pour sa santé, étant donné les fortes taxes qui affligent l'alcool, etc. On boit moins de spiritueux et d'apéritifs, on préfère plutôt consommer en mangeant, d'où la popularité accrue du vin.

Malgré ces nouvelles tendances en matière de consommation d'alcool, il ne faut pas crier trop rapidement victoire. Le problème des excès n'est pas résolu, avec toutes les conséquences que cela implique.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

CLARKSON M. / MINISTERE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Enquête canadienne sur la promotion de la santé, description des données québécoises, Québec, Service des études socio-sanitaires, 1987, 174 p., (Collection Etudes de santé).

DE LINT J., SCHMIDT W., "Consumption averages and alcoholism prevalence: a brief review of epidemiological investigations" in British Journal of Addiction, 1977, 66: 97-107.

MINISTERE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, DÉPARTEMENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE, Et la santé, ça va ? Rapport de l'enquête Santé Québec 1987, Tome 1, Québec, Les publications du Québec, 1988, 337 p.

MINISTERE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ETRE SOCIAL, STATISTIQUE CANADA, La santé des Canadiens: Rapport de l'Enquête Santé Canada, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1981, 243 p.

ROY L., Le point sur les habitudes de vie : l'alcool, Conseil des Affaires sociales et de la famille, Sillery, CASF, 1985, 117 p.

STATISTIQUE CANADA, Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada, Cat.63-202, Ottawa, Ministère des Approvisionnements et Services, 1989.

WILLIAMS G.D., DOERNBERG D., STINSON F., NOBLE J., "Epidemiologic Bulletin no. 12 - State, regional, and national trends in apparent per capita consumption" in Alcohol Health and Research World, 1986, 10, 4: 60-63.

COLLECTION DONNÉES STATISTIQUES ET INDICATEURS

DERNIERS TITRES PARUS

(DGPE*) **Perspectives démographiques par région socio-sanitaire, Québec, 1986 à 2061, scénario moyen.**
(S. HAINCE, Direction de l'évaluation, 1990)

(DGPE) **Perspectives démographiques par CLSC, DSC, RSS, Québec, 1986 à 2061, scénario moyen.**
(S. HAINCE, Direction de l'évaluation, 1990)

(DGPE) **Rapport annuel des nouveaux cas de cancer déclarés au fichier des tumeurs du Québec - Année 1987.**
(M. BEAUPRÉ, Direction de l'évaluation, 1990)

(DGPE #3) **Engorgement des urgences: portrait statistique récent et données évolutives.**
(S. MONTREUIL et M.-R. ROY, Direction de l'évaluation, 1989)

(DGPE #2) **Statistiques évolutives des dépenses gouvernementales pour la mission sociale de 1979-80 à 1988-89.**
(R. CÔTÉ, Direction de l'évaluation, 1989)

(DGPE) **Rapport annuel des nouveaux cas de cancer déclarés au fichier des tumeurs du Québec - Année 1986.**
(M. BEAUPRÉ, Direction de l'évaluation, 1989)

(DGPE) **Rapport annuel des nouveaux cas de cancer déclarés au fichier des tumeurs du Québec - Année 1985.**
(M. BEAUPRÉ, Direction de l'évaluation, 1989)

(DGPE) **Le système de santé et de services sociaux du Québec: un aperçu.**
(M.-A. ST-PIERRE et collaborateurs, 1989)

(DGPE #1) **Statistiques évolutives des dépenses gouvernementales pour la mission sociale de 1978-79 à 1987-88.**
(R. CÔTÉ, Direction de l'évaluation, 1988)

(DGPE) **Rapport annuel des nouveaux cas de cancer déclarés au fichier des tumeurs du Québec - Année 1984.**
(M. BEAUPRÉ, Direction de l'évaluation, 1988)

(DE**) **Statistiques MED-ECHO 1982-83 à 1986-87.**
(S. HAINCE, Direction de l'évaluation, 1989)

(DE) **Évolution de la situation des urgences: rapport semestriel d'avril 1988.**
(M.-R. ROY et R. JACOB, Direction de l'évaluation, 1988)

* DGPE: Direction générale de la planification et de l'évaluation
** DE: Direction de l'évaluation

(DE) **La population du Québec selon le recensement canadien de 1986 par groupe d'âges quinquennal et par sexe selon les territoires de CLSC, DSC et RSS.**
(M. MECTEAU, M. BLONDEAU et S. HAINCE, Direction de l'évaluation, 1988)

(DE) **Statistiques MED-ECHO 1980-81 à 1984-85.**
(S. HAINCE, Direction de l'évaluation, 1987)

La collection Données statistiques et Indicateurs, publiée par la Direction générale de la planification et de l'évaluation, prend la suite de la série Données statistiques, produite par la Direction de l'évaluation de 1982 à 1988.

La liste complète des documents déjà publiés par la Direction de l'évaluation est disponible à l'adresse suivante: MSSS, Direction de l'évaluation, 1075 Chemin Ste-Foy, 3è étage, Québec, G1S 2M1 Tél.: (418) 646-8890

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction générale de la planification et de l'évaluation

90-843-C